

## Die einzige Sojabohne für Direktfütterung

- Trypsin-Inhibitor reduzierte Sorte
- Direkte Verfütterung ohne Toastung möglich
- Dunkler Nabel und mittelgroßes Korn

### Sorteneigenschaften:

Reifegruppe:	00
Sortentyp:	mittleres Verzweigungspotential
Nutzung:	Direkt-Verfütterung
Blütenfarbe:	violett
Nabelfarbe:	dunkel braun

### Agronomische Eigenschaften\*:

Jugendentwicklung:	7
Reife:	7
Wuchshöhe:	7
Neigung zu Lagerung:	4
1000 Korngewicht	7
Neigung zu Kornausfall:	3
Anfälligkeit für Peronospora:	3
Anfälligkeit für Sclerotinia:	3
Anfälligkeit für Bakteriosen:	3
Anfälligkeit für Virusbefall:	4

\* ... Quelle: EU-Sorten/Eigene Einstufung  
1 = geringe Ausprägung, 9 = starke Ausprägung



### Ertragspotenzial\*:

Kornertrag:	6
Proteingehalt:	6
Ölgehalt:	6

### Kulturführung:

Aussaat Zeit:	ab Mitte April (10°C Bodentemperatur)
Aussaat Menge:	55-60 Körner/m <sup>2</sup> = 4 Pck./ha
Aussaat Technik:	Drillsaat / Einzelkorn – Reihen auch bis 75cm
Impfung:	mit Rhizobien vorinokuliertes Saatgut verfügbar

**Sortenbeschreibung:** XONIA deckt mit ihren extrem großen Blättern den Boden rasch ab und kann im Stall direkt (ohne Toasten) verfüttert werden. Einfach saustark am Feld und im Stall!